女性血清护骨素和转化生长因子 $\beta 1$ 与骨丢失率的关系

龙海燕¹ 张红² 伍贤平² 廖二元² 谢辉² 罗湘杭² 伍西羽^{2*}

1. 湖南省娄底市中心医院内分泌科, 湖南 娄底 417000

2. 中南大学湘雅二医院代谢内分泌研究所, 长沙 410011

中图分类号: R589.5 文献标识码: A 文章编号: 1006-7108(2014) 01-0005-07

摘要: 目的 护骨素(OPG)和转化生长因子 $\beta 1$ (TGF- $\beta 1$)与骨代谢密切相关。本研究调查女性血清OPG和TGF- $\beta 1$ 水平与骨丢失率(BLR)的关系,以及这两种细胞因子对BLR的影响。方法 横断面研究465例健康成年女性,年龄35~80岁。测量血清OPG和TGF- $\beta 1$ 水平,DXA骨密度仪测量腰椎、髋部和前臂远端的骨密度(BMD)和BLR。结果 各骨骼部位BLR与血清OPG呈负相关($r = -0.122$ 至 -0.230 , $P = 0.007-0.000$),与血清TGF- $\beta 1$ 呈正相关($r = 0.245-0.365$, $P = 0.000$)。调整年龄和BMI后,TGF- $\beta 1$ 与腰椎和前臂超远端BLR的偏相关性仍然有显著意义。多元线性回归分析显示,OPG对BLR是一个负性决定因素,大约可以解释BLR变异的1.4%~3.7%;TGF- $\beta 1$ 对BLR是一个正性决定因素,可以解释BLR变异的5.3%~13.3%。结论 该研究揭示了成年女性循环中OPG和TGF- $\beta 1$ 水平与骨丢失率的关系,提示TGF- $\beta 1$ 和OPG水平变化与骨丢失率有关,TGF- $\beta 1$ 可能是女性骨丢失率的独立决定因素。

关键词: 护骨素;转化生长因子- $\beta 1$;骨丢失率;女性;骨质疏松

Relationship between serum levels of OPG and TGF- $\beta 1$ and bone loss rate in women

LONG Haiyan¹, ZHANG Hong², WU Xianping², LIAO Eryuan², XIE Hui², LUO Xianghang², WU Xiyu²

1. Department of Endocrinology, Loudi Central Hospital, Loudi 417000

2. Institute of Metabolism and Endocrinology, the Second Xiangya Hospital, Central South University, Changsha 410011, China

Corresponding author: WU Xiyu, Email: wuxiyu640@sohu.com

Abstract: Objective To investigate the relationship between serum levels of OPG and TGF- $\beta 1$ and bone loss rate (BLR) in women, and to explore the effect of these 2 kinds of cytokines on BLR. **Methods** A cross-sectional study was performed. A total of 465 healthy adult women, aging from 35 to 80 years old were included in this study. The serum levels of OPG and TGF- $\beta 1$ were determined. Bone mineral density (BMD) and BLR of the lumbar vertebrae, the hip, and the distal forearm were detected using DXA. **Results** A negative correlation between BLR of all the parts and the serum level of OPG ($r = -0.122$ to -0.230 , all $P = 0.007-0.000$) was observed, while a positive correlation between BLR and serum TGF- $\beta 1$ ($r = 0.245-0.365$, all $P = 0.000$) existed. After adjusting for age and BMI, the significant correlation between serum TGF- $\beta 1$ and BLR of the lumbar vertebrae and the ultradistal forearm still existed. Multiple linear regression analysis showed that serum OPG was a negative determinant of BLR, explaining 1.4-3.7% of BLR variation. Serum TGF- $\beta 1$ was a positive determinant of BLR, which could explain 5.3-13.3% BLR variation. **Conclusion** This study has revealed the relationship between serum levels of OPG and TGF- $\beta 1$ and BLR in adult women, which indicates that the changes of TGF- $\beta 1$ and OPG levels are associated with BLR, and TGF- $\beta 1$ may be an independent determinant for BLR in women.

Key words: Osteoprotegerin; TGF- $\beta 1$; Bone loss rate; Women; Osteoporosis

护骨素(OPG)和转化生长因子- $\beta 1$ (TGF- $\beta 1$)是与骨代谢密切相关的细胞因子^[1,2]。OPG是由成骨细胞/基质细胞分泌的一种重要细胞因子,在骨重建平衡中起重要作用^[3]。小鼠OPG基因敲除导致

严重骨质疏松症^[4],OPG转基因则导致骨质硬化^[2,5]。在绝经后妇女,循环中的OPG水平是骨转换和骨量变化及椎体骨折患病率的重要决定因素^[6,7]。TGF- $\beta 1$ 也是由成骨细胞表达的,它不仅刺激破骨细胞分化和维持破骨细胞生存^[8],而且也调节骨形成和骨吸收^[9]。绝经后低骨量和骨质疏松

*通讯作者: 伍西羽, Email: wuxiyu640@sohu.com

妇女,血清 TGF- β 1 水平显著下降和骨折风险增加^[10]。骨丢失率(BLR)是各种双能 X 线吸收法(DXA)骨密度仪测量的重要参数,如 Hologic 的 DXA 骨密度仪测量报告显示的峰值参考值 PR(%), GE-Lunar DXA 报告显示的年轻成人平均值 YAM(%), PR(%) 和 YAM(%) 表示受试者骨密度(BMD)相当于峰值 BMD (PBMD)的百分率,受试者 BLR(%) = PR(%) 或 YAM(%) - 100%。BLR 是与骨质疏松诊断密切相关的一个指标,按照日本的诊断标准受试者 BMD 低于同性别 YAM 70% (即 BLR $\leq$ -30%) 诊断为骨质疏松^[11], 中国老年学学会骨质疏松委员会的标准受试者 BMD 减少 25% 以下(即 BLR $\leq$ -25%) 诊断为骨质疏松^[12]。本研究横断面调查长沙地区女性血清 OPG 和 TGF- β 1 与 BLR 之间的关系,以及 OPG 和 TGF- β 1 对 BLR 的影响。

1 资料与方法

1.1 研究对象

随机选择长沙地区健康女性 465 例,年龄范围 35 ~ 80 岁。受试者通过详细填写表格和询问病史,排除因各种疾病因素和药物因素影响骨代谢者。这些研究对象包括绝经前妇女 142 例,围绝经期妇女 58 例,绝经后妇女 265 例,平均绝经年龄 48.3 ± 3.83 岁(41 ~ 57 岁)和绝经中位数 11.0 年(1 ~ 40 年)。

1.2 OPG、TGF- β 1 和 BMD 测量

早晨 7 ~ 9 点采集空腹血液,1 h 内离心分离血清置 -70 °C 冰箱存储直至测定。测定血清 TGF- β 1 采用酶联免疫吸附法(ELISA)试剂盒(DRG International Inc., Highway, Mountainside, NJ, USA),测定血清 OPG 也采用 ELISA 试剂盒(Biomedica Gruppe, Vienna, Austria),仪器为微量板全波长紫外分光光度计(Bio-Tek Instruments, Inc., Winooski, VT)。该方法测定 OPG 的最低检测限为 0.14 pmol/L,批内和批间变异系数(CV)分别为 6.4% 和 8.2%;TGF- β 1 的最低检测限为 0.002 μ g/L,批内和批间 CV 分别为 3.8% 和 8.8%。

采用扇形束 DXA 骨密度仪(Hologic Delphi A; Hologic, Bedford, MA, USA)测量不同骨骼部位的 BMD,包括正位腰椎(PA, L1-L4),髌部股骨颈(FN)和总体髌部(Hip),非优势前臂的超远端(RUUD)和远端 1/3 处(RU1/3)。该仪器测量这些骨骼部位

BMD 变异系数的平均方根(RMSCV)分别是 PA 腰椎 0.83%, FN 和 Hip 分别是 1.88% 和 0.88%, RUUD 和 RU1/3 分别是 2.21% 和 0.86%。日常测量腰椎假体模型的长期(超过 14 年)CV < 0.45%。

1.3 统计学处理

统计和作图采用 SPSS V16.0 分析软件(SPSS Inc., Chicago, IL., USA)。因为 OPG 和 TGF- β 1 水平不呈正态分布,两者的平均值和标准差采用几何平均值 $\pm$ 标准差。各组之间平均值的显著性检验采用单因素方差分析(ANOVA)。OPG 和 TGF- β 1 与不同骨骼部位 BLR 之间的相关性采用 Pearson's 相关分析。BMD 数据库采用本所建立的 BMD 参考数据库^[13],受试者 BLR(%) = 受试者 PR% - 100%。OPG 和 TGF- β 1 对 BLR 的影响采用多元线性回归分析。

2 结果

2.1 研究对象基本资料的特征

表 1 显示绝经前妇女的身高、TGF- β 1 水平、PA 腰椎、股骨颈、Hip 和 RUUD 的 BMD 显著高于围绝经和绝经后妇女,血清 OPG 水平则显著低于围绝经和绝经后妇女。围绝经妇女的身高、体重、PA 腰椎、股骨颈、Hip 和 RUUD 的 BMD 显著高于绝经后妇女。

2.2 年龄相关的血清 OPG、TGF- β 1 和 BLR

表 2 显示在 35 ~ 44 岁时,血清 OPG 处于最低水平,而 TGF- β 1 则处于最高水平;血清 OPG 在 45 ~ 54 岁处于最高水平,45 岁之后各年龄组的 TGF- β 1 水平没有显著性差异。与 35 ~ 44 岁组比较,45 岁之后各骨骼部位的 BLR,随年龄的递增呈显著增加趋势,到 ≥ 65 岁, RUUD 的平均 BLR 为 -34.1%, 显著高于其他骨骼部位的 BLR。

2.3 OPG 和 TGF- β 1 与 BLR 之间的相关性

图 1 和图 2 分别显示血清 OPG 和 TGF- β 1 与不同骨骼部位 BLR 的散点分布和相关性。血清 OPG 水平与各骨骼区域 BLR 呈显著负相关,血清 TGF- β 1 水平与不同骨骼部位 BLR 呈显著正相关。表 3 显示 OPG 和 TGF- β 1 与不同骨骼部位 BLR 相关系数和偏相关系数。血清 TGF- β 1 与 OPG 呈显著负相关。控制年龄和 BMI 后,血清 OPG 与各骨骼部位 BLR 的偏相关系数没有显著意义,血清 TGF- β 1 与 PA 腰椎和 RUUD 的 BLR 的偏相关系数仍然有显著意义。

表1 受试者的基本资料 ($\bar{x} \pm s$)

Table 1 General information of the subjects ($\bar{x} \pm s$)

指标	绝经前妇女 (n = 142)	围绝经期妇女 (n = 58)	绝经后妇女 (n = 265)	全部受试者 (n = 465)
年龄 (岁)	40.8 ± 3.50	48.0 ± 2.95	59.7 ± 7.30	52.5 ± 10.5
身高 (cm)	156.2 ± 5.38 [▲]	154.2 ± 5.05 [#]	151.9 ± 4.54	153.5 ± 5.23
体重 (kg)	56.9 ± 7.38 [#]	57.1 ± 8.03 [#]	54.3 ± 8.46	55.5 ± 8.18
BMI (kg/m ²)	23.3 ± 2.68	24.0 ± 3.03	23.5 ± 3.34	23.5 ± 3.12
OPG (pmol/L)*	2.67 ± 1.86 [▲]	4.11 ± 1.96	4.40 ± 1.85	3.75 ± 1.94
TGF-β1 (μg/L)*	39.0 ± 1.60 [▲]	27.1 ± 1.67	24.0 ± 1.52	28.3 ± 1.64
PA-BMD (g/cm ²)	0.970 ± 0.108 [▲]	0.912 ± 0.112 [#]	0.758 ± 0.118	0.842 ± 0.151
FN-BMD (g/cm ²)	0.791 ± 0.103 [▲]	0.758 ± 0.098 [#]	0.641 ± 0.103	0.701 ± 0.124
Hip-BMD (g/cm ²)	0.863 ± 0.108 [▲]	0.836 ± 0.107 [#]	0.713 ± 0.106	0.774 ± 0.128
RUUD-BMD (g/cm ²)	0.451 ± 0.045 [▲]	0.434 ± 0.053 [#]	0.345 ± 0.061	0.388 ± 0.075
RU1/3-BMD (g/cm ²)	0.711 ± 0.044	0.705 ± 0.046	0.597 ± 0.076 [■]	0.645 ± 0.085

注: * 几何平均值和标准差;与围绝经和绝经后妇女比较, [▲]P = 0.045 - 0.000;与绝经后妇女比较, [#]P = 0.002 - 0.000;与绝经前和围绝经期妇女比较, [■]P = 0.000

表2 年龄相关的血清 OPG 和 TGF-β1 水平及各骨骼部位 BLR

Table 2 Age-related serum levels of OPG and TGF-β1 and BLR in different location

指标	35 ~ 44 (岁) (n = 128)	45 ~ 54 (岁) (n = 146)	55 ~ 64 (岁) (n = 117)	≥65 (岁) (n = 74)
OPG (pmol/L)*	2.61 ± 1.88 [#]	4.76 ± 1.84 [▲]	4.09 ± 1.87	3.77 ± 1.88
TGF-β1 (μg/L)*	38.9 ± 1.64 [#]	25.2 ± 1.63	25.0 ± 1.52	24.9 ± 1.44
PA-BLR (%)	-1.72 ± 11.3 [#]	-13.1 ± 13.8 [▲]	-23.6 ± 10.8	-26.3 ± 11.4
FN-BLR (%)	-3.07 ± 12.5 [#]	-10.2 ± 14.5 [▲]	-21.1 ± 11.1 [■]	-27.4 ± 9.85
Hip-BLR (%)	-2.34 ± 12.2 [#]	-9.96 ± 13.7 [▲]	-18.6 ± 10.8 [■]	-25.0 ± 10.1
RUUD-BLR (%)	-1.02 ± 9.62 [#]	-9.61 ± 13.6 [▲]	-24.1 ± 10.9 [■]	-34.1 ± 10.3 [▲]
RU1/3-BLR (%)	-1.66 ± 5.78 [#]	-6.32 ± 8.94 [▲]	-17.3 ± 8.81 [■]	-25.8 ± 7.77

注: * 几何平均值和标准差;与 45 ~ 54 岁、55 ~ 64 岁和 ≥65 岁组比较, [#]P = 0.012 - 0.000;与 55 ~ 64 岁和 ≥65 岁组比较, [▲]P = 0.049 - 0.000;与 ≥65 岁组比较, [■]P = 0.011 - 0.000;在同一年龄组与其它骨骼部位比较, ^ΔP = 0.003 - 0.000

图1 血清 OPG 浓度与各骨骼部位骨丢失率 (BLR) 的相关散点图

Fig. 1 Scatter plots of serum levels of OPG versus BLR in different location

注: A: $y = -8.653 - 1.343(OPG)$, $r = -0.230$ ($P = 0.000$); B: $y = -10.461 - 0.725(OPG)$, $r = -0.122$ ($P = 0.007$); C: $y = -8.696 - 0.825(OPG)$, $r = -0.148$ ($P = 0.001$); D: $y = -8.942 - 1.289(OPG)$, $r = -0.205$ ($P = 0.000$); E: $y = -7.669 - 0.709(OPG)$, $r = -0.158$ ($P = 0.001$)

图2 血清 TGF-β1 浓度与各骨骼部位骨丢失率 (BLR) 的相关散点图

Fig. 2 Scatter plots of serum levels of TGF-β1 versus BLR in different location

注: A: $y = 0.343(\text{TGF-}\beta 1) - 25.673$, $r = 0.365$ ($P = 0.000$); B: $y = 0.230(\text{TGF-}\beta 1) - 21.129$, $r = 0.245$ ($P = 0.000$); C: $y = 0.247(\text{TGF-}\beta 1) - 20.340$, $r = 0.276$ ($P = 0.000$); D: $y = 0.348(\text{TGF-}\beta 1) - 25.912$, $r = 0.344$ ($P = 0.000$); E: $y = 0.193(\text{TGF-}\beta 1) - 17.077$, $r = 0.266$ ($P = 0.000$)

图3 血清 OPG 按四分位分组各组骨丢失率 (BLR) 比较

Fig. 3 Comparison of BLR between different groups displayed by OPG concentration

注: Q1: 第一分位 ($\text{OPG} < 2.530$ pmol/L); Q2: 第二分位 ($\text{OPG} = 2.530 - 4.000$ pmol/L); Q3: 第三分位 ($\text{OPG} = 4.001 - 6.280$ pmol/L); Q4: 第四分位 ($\text{OPG} > 6.280$ pmol/L)。与 Q3 和 Q4 比较, ▼ $P = 0.045 - 0.000$; 与 Q3 比较, ▲ $P = 0.010 - 0.000$

图4 血清 TGF-β1 按四分位分组各组骨丢失率 (BLR) 比较

Fig. 4 Comparison of BLR between different groups displayed by TGF-β1 concentration.

注: Q1: 第一分位 ($\text{TGF-}\beta 1 < 20.11$ μg/L); Q2: 第二分位 ($\text{TGF-}\beta 1 = 20.11 - 27.17$ μg/L); Q3: 第三分位 ($\text{TGF-}\beta 1 = 27.18 - 40.46$ μg/L); Q4: 第四分位 ($\text{TGF-}\beta 1 > 40.46$ μg/L)。与 Q1、Q2 和 Q3 比较, ▼ $P = 0.043 - 0.000$; 与 Q1 和 Q2 比较, ▲ $P = 0.039 - 0.000$ 。

2.4 OPG 和 TGF-β1 与 BLR 的关系

图 3 和图 4 分别显示 OPG 和 TGF-β1 水平按四分位数分组,各组之间 BLR 的比较。OPG 按四分位分组时,在 PA 腰椎、Hip 和 RUUD, Q1 组和 Q2 组的 BLR 显著小于 Q3 组和 Q4 组;在 FN 和 RU1/3, Q3 组的平均 BLR 最大,显著大于 Q1 组和 Q2 组。TGF-β1 按四分位分组时,各骨骼部位的 BLR, Q4 组显著低于 Q1 组、Q2 组和 Q3 组。

以 OPG 和 TGF-β1 作为自变量,分别以不同骨骼部位的 BLR 作为因变量,进行多元线性回归 stepwise 分析(表 4)。结果显示 OPG 对各骨骼部位 BLR 是有意义的负性决定因素,OPG 对各骨骼部位 BLR 变化的影响大约为 1.4% ~ 3.7%。TGF-β1 对各骨骼部位 BLR 是有意义的正性决定因素,对各骨骼部位 BLR 变化的影响大约为 5.3% ~ 13.3%。

表 3 血清 OPG 和 TGF-β1 与各骨骼部位 BLR 之间的相关系数(r)

Table 3 Correlation coefficients (r) for OPG and TGF-β1 with BLR in different location

指标	OPG		TGF-β1	
	r	调整 r	r	调整 r
TGF-β1	-0.270 *	-0.215 *		
PA-BLR	-0.230 *	-0.044	0.365 *	0.183 *
FN-BLR	-0.122 *	0.066	0.245 *	0.014
Hip-BLR	-0.148 *	0.040	0.276 *	0.080
RUUD-BLR	-0.205 *	-0.024	0.344 *	0.104 *
RU1/3-BLR	-0.158 *	0.014	0.266 *	-0.020

注: * P = 0.036 - 0.000

表 4 血清 OPG 和 TGF-β1 与各骨骼部位 BLR 的多元线性回归分析

Table 4 Multiple linear regression analysis of OPG and TGF-β1 with BLR in different location

因变量	OPG		TGF-β1	
	β	R ² C (%)	β	R ² C (%)
PA-BLR	-0.179 *	2.9	0.309 *	13.3
FN-BLR	-0.127 *	1.4	0.190 *	5.3
Hip-BLR	-0.138 *	1.7	0.229 *	7.4
RUUD-BLR	-0.202 *	3.7	0.266 *	10.8
RU1/3-BLR	-0.183 *	3.0	0.188 *	6.0

注: * P = 0.012 - 0.000

3 讨论

本研究证实女性血清 OPG 水平与骨丢失率呈负相关关系,表明女性各骨骼部位骨丢失率随 OPG 水平的增加而增加,循环中 OPG 水平较高者骨丢失率较高。血清 TGF-β1 水平与骨丢失率呈正相关,

提示骨丢失率随 TGF-β1 水平的增加而减少,循环中 TGF-β1 水平较高者骨丢失率较低,TGF-β1 水平较低者骨丢失率较高。经年龄和 BMI 调整后,OPG 水平与骨丢失率的偏相关系数没有显著意义,说明骨丢失率与循环中 OPG 的关系受年龄和 BMI 的影响,如果排除这些影响,OPG 与骨丢失率的相关性就会削弱或消失。控制年龄和 BMI 后,腰椎和前臂超远端的骨丢失率与 TGF-β1 之间的偏相关系数仍然有显著意义,说明 TGF-β1 与这些骨骼部位骨丢失率的关系尽管受年龄和 BMI 的影响,但仍然存在密切关系。这些现象也提示,循环中的 TGF-β1 水平与不同骨骼部位骨丢失率的关系,可能存在骨骼部位差异。

本组女性在 45 ~ 54 岁组血清 OPG 水平最高,是因为她们正处在绝经后早期的快速骨丢失期,此时循环中 OPG 水平增加,可能是一种抵抗快速骨丢失的代偿性防御机制^[14]。OPG 是成骨细胞/基质细胞分泌的一种诱饵受体,它与细胞核因子 κB 受体活化因子(RANK)竞争性结合其配体 RANKL,抑制破骨细胞分化、活化和生存,促进破骨细胞凋亡^[3],从而具有抵抗骨丢失的作用。在 TGF-β1 低水平环境中,基质细胞/成骨细胞表达的 RANKL/OPG 比率上升,刺激破骨细胞分化;在 TGF-β1 高水平环境中,基质细胞/成骨细胞表达的 RANKL/OPG 比率下降,则抑制破骨细胞分化。对基础人群的研究显示,女性绝经后血清 OPG 水平增加与患骨质疏松和椎体骨折危险性增加有关^[6],但 Ueland 等^[15]对澳大利亚老年妇女的研究显示,OPG 基因多态性或血清 OPG 水平变化与患骨质疏松没有关系。另一研究显示女性血清 OPG 水平与骨转换指标 TRACP-5b、OC 和 CTX 呈正相关^[16],认为循环中的 OPG 可能有保护性预防骨丢失的作用,绝经后 OPG 水平较高者骨丢失率可能较低,从而提高了髌部的骨强度^[17]。新的大样本追踪研究显示,女性骨丢失率与循环中的 OPG 水平有关,血清 OPG 水平较高者骨丢失率较大^[18],与本研究结果相似。其他报告显示,甲状腺功能亢进^[19]和肠炎患者^[20]血清 OPG 水平增加,可能有利于防止过多的骨丢失。患肥胖症的围绝经妇女血清 OPG 水平显著降低^[21],认为循环中的 OPG 对这些患者的骨丢失可能不起保护作用。对女性大样本基础人群的研究显示,TGF-β1 基因常见的多态性变异,对各种骨转换指标、BMD 和骨丢失没有影响^[22]。但许多研究显示,TGF-β1 水平变化与骨转换速率有关^[23-25],如 TGF-β1 基因 TT 基因型

妇女血清 TGF- β 1 水平增加和骨丢失率减少^[23], TC 基因型妇女则脆性骨折患病率增加^[24]。研究结果不一致的现象,可能与不同研究组所选择的研究对象的年龄不匹配有关。早期研究显示, TGF- β 1 是雌激素的下游因子^[26], TGF- β 1 与 VitD 信号途径协同^[27], 在骨代谢局部调节中起重要作用。新的研究显示, TGF- β 1 基因多态性与 Vit D 协同, 对预防绝经后骨质疏松性椎体骨折起重要作用^[28]。

本研究还证实, OPG 和 TGF- β 1 按四分位数分组, 不同组之间的骨丢失率存在明显差异。OPG 分组时, 在 OPG 水平较低的 Q1 和 Q2 组, 腰椎、髋部和前臂超远端的骨丢失率显著低于 Q3 和 Q4 组; 在股骨颈和前臂 1/3 处, OPG 较低的 Q1 组的骨丢失率显著低于 Q3 和 Q4 组, Q2 组显著低于 Q3 组。TGF- β 1 分组时, 不同组之间骨丢失率的变化趋势与 OPG 分类时相反, 即 TGF- β 1 水平较低的 Q1 和 Q2 组各骨骼部位的骨丢失率最大, TGF- β 1 水平较高的 Q4 组各骨骼部位的骨丢失率最小。骨丢失率随 TGF- β 1 水平增加而下降的现象与其他研究结果相似^[29]。基础研究显示, TGF- β 1 基因敲除小鼠其胫骨干骺端的骨量减少 30%, BMD 和骨的强度显著下降^[29]。TGF- β 1 对骨细胞的调节作用具有双相性, 低浓度 TGF- β 1 促进成骨细胞/基质细胞上调 RANKL/OPG 比率, 刺激破骨细胞分化, 但在高浓度 TGF- β 1 环境中的作用则相反^[30]。随后的研究显示, TGF- β 1 主要是由沉积在骨基质中分化的成骨细胞表达的^[31]。

多元线性回归 stepwise 分析显示, OPG 和 TGF- β 1 可能是成年女性骨丢失率的独立决定因素。循环中 OPG 水平变化, 大约可以解释各骨骼部位骨丢失率变异的 1.4% ~ 3.7%; TGF- β 1 水平变化, 可以解释各骨骼部位骨丢失率变异的 5.3% ~ 13.3%, TGF- β 1 对不同骨骼部位骨丢失率变异的影响, 大约是 OPG 的 2.0 ~ 4.6 倍, 但两者对骨丢失率的作用则完全相反。

综上所述, 本研究揭示了成年女性血清 OPG 和 TGF- β 1 水平与不同骨骼部位骨丢失率的关系, 提示女性循环中的 TGF- β 1 和 OPG 水平变化与骨丢失率有关, TGF- β 1 是女性骨丢失率的重要正性决定因素。

【参 考 文 献】

[1] Janssens K, ten Dijke P, Janssens S, et al. Transforming growth factor-beta 1 to the bone. *Endocr Rev*, 2005, 26:743-774.

- [2] Simonet WS, Lacey DL, Dunstan CR, et al. Osteoprotegerin: a novel secreted protein involved in the regulation of bone density. *Cell*, 1997, 89:309-319.
- [3] Hofbauer LC, Khosla S, Dunstan CR, et al. The roles of osteoprotegerin and osteoprotegerin ligand in the paracrine regulation of bone resorption. *J Bone Miner Res*, 2000, 15:2-12.
- [4] Mizuno A, Amizuka N, Irie K, et al. Severe osteoporosis in mice lacking osteoclastogenesis inhibitory factor/osteoprotegerin. *Biochem Biophys Res Commun*, 1998, 247:610-615.
- [5] Yasuda H, Shima N, Nakagawa N, et al. Osteoclast differentiation factor is a ligand for osteoprotegerin/osteoclastogenesis-inhibitory factor and is identical to TRANCE/RANKL. *Proc Natl Acad Sci USA*, 1998, 95:3597-3602.
- [6] Mezquita-Raya P, de la Higuera M, García DF, et al. The contribution of serum osteoprotegerin to bone mass and vertebral fractures in postmenopausal women. *Osteoporos Int*, 2005, 16:1368-1374.
- [7] Rogers A, Saleh G, Hannon RA, et al. Circulating estradiol and osteoprotegerin as determinants of bone turnover and bone density in postmenopausal women. *J Clin Endocrinol Metab*, 2002, 87:4470-4475.
- [8] Fuller K, Lean JM, Bayley KE, et al. A role for TGF- β 1 in osteoclast differentiation and survival. *J Cell Sci*, 2000, 113:2445-2453.
- [9] Chenu C, Pfeilschifter J, Mundy GR, et al. Transforming growth factor beta inhibits formation of osteoclast-like cells in long-term human marrow cultures. *Proc Natl Acad Sci USA*, 1988, 85:5683-5687.
- [10] Uttenam D, Tungtrongchitr A, Phonrat B, et al. Association of T869C gene polymorphism of transforming growth factor- β 1 with low protein levels and anthropometric indices in osteopenia/osteoporosis postmenopausal Thai women. *Genet Mol Res*, 2012, 11:87-99.
- [11] Orimo H, Hayashi Y, Fukunaga M, et al. Diagnostic criteria for primary osteoporosis; year 2000 revision. *J Bone Miner Metab*, 2001, 19:331-337.
- [12] Liu Z, Piao J, Pang L, et al. The diagnostic criteria for primary osteoporosis and the incidence of osteoporosis in China. *J Bone Miner Metab*, 2002, 20:181-189.
- [13] Wu XP, Liao EY, Zhang H, et al. Establishment of BMD reference plots and determination of peak BMD at multiple skeletal regions in mainland Chinese women and the diagnosis of osteoporosis. *Osteoporos Int*, 2004, 15:71-79.
- [14] Kudlacek S, Schneider B, Woloszczuk W, et al. Serum levels of osteoprotegerin increase with age in a healthy adult population. *Bone*, 2003, 32:681-686.
- [15] Ueland T, Bollerslev J, Wilson SG, et al. No associations between OPG gene polymorphisms or serum levels and measures of osteoporosis in elderly Australian women. *Bone*, 2007, 40:175-181.
- [16] Indridason OS, Franzson L, Sigurdsson G. Serum osteoprotegerin

- and its relationship with bone mineral density and markers of bone turnover. *Osteoporos Int*, 2005, 16:417-423.
- [17] Samelson EJ, Broe KE, Demissie S, et al. Increased plasma osteoprotegerin concentrations are associated with indices of bone strength of the hip. *J Clin Endocrinol Metab*, 2008, 93:1789-1795.
- [18] Jørgensen L, Vik A, Emaus N, et al. Bone loss in relation to serum levels of osteoprotegerin and nuclear factor- κ B ligand; the Tromsø Study. *Osteoporos Int*, 2010, 21:931-938.
- [19] Mochizuki Y, Banba N, Hattori Y, et al. Correlation between serum osteoprotegerin and biomarkers of bone metabolism during anti-thyroid treatment in patients with Graves' disease. *Horm Res*, 2006, 66:236-239.
- [20] Moschen AR, Kaser A, Enrich B, et al. The RANKL/OPG system is activated in inflammatory bowel disease and relates to the state of bone loss. *Gut*, 2005, 54:479-487.
- [21] Holecki M, Zahorska-Markiewicz B, Janowska J, et al. Osteoprotegerin—does it play a protective role in the pathogenesis of bone loss in obese perimenopausal women? *Endokrynol Pol*, 2007, 58:7-10.
- [22] McGuigan FE, Macdonald HM, Bassiti A, et al. Large-scale population-based study shows no association between common polymorphisms of the TGFBI gene and BMD in women. *J Bone Miner Res*, 2007, 22:195-202.
- [23] Hinke V, Seck T, Clanget C, et al. Association of transforming growth factor- β 1 (TGF β 1) T29 $\rightarrow$ C gene polymorphism with bone mineral density (BMD), changes in BMD, and serum concentrations of TGF- β 1 in a population-based sample of postmenopausal German women. *Calcif Tissue Int*, 2001, 69:315-320.
- [24] Lau HH, Ho AY, Luk KD, et al. Transforming growth factor- β 1 gene polymorphisms and bone turnover, bone mineral density and fracture risk in southern Chinese women. *Calcif Tissue Int*, 2004, 74:516-521.
- [25] Akinci B, Bayraktar F, Saklamaz A, et al. Low transforming growth factor- β 1 serum levels in idiopathic male osteoporosis. *J Endocrinol Invest*, 2007, 30:350-355.
- [26] Hughes DE, Dai A, Tiffée JC, et al. Estrogen promotes apoptosis of murine osteoclasts mediated by TGF- β . *Nat Med*, 1996, 2:1132-1136.
- [27] Yanagisawa J, Yanagi Y, Masuhiro Y, et al. Convergence of transforming growth factor- β and vitamin D signaling pathways on SMAD transcriptional coactivators. *Science*, 1999, 283:1317-1321.
- [28] Mori S, Fuku N, Chiba Y, et al. Cooperative effect of serum 25-hydroxyvitamin D concentration and a polymorphism of transforming growth factor- β 1 gene on the prevalence of vertebral fractures in postmenopausal osteoporosis. *J Bone Miner Metab*, 2010, 28:446-450.
- [29] Geiser AG, Zeng QQ, Sato M, et al. Decreased bone mass and bone elasticity in mice lacking the transforming growth factor- β 1 gene. *Bone*, 1998, 23:87-93.
- [30] Karst M, Gorny G, Sells Galvin RJ, et al. Roles of stromal cell RANKL, OPG, and M-CSF expression in biphasic TGF- β regulation of osteoclast differentiation. *J Cell Physiol*, 2004, 200:99-106.
- [31] Toom A, Arend A, Gunnarsson D, et al. Bone formation zones in heterotopic ossification: histologic findings and increased expression of bone morphogenetic protein 2 and transforming growth factors β 2 and β 3. *Calcif Tissue Int*, 2007, 80:259-267.

(收稿日期:2013-06-14)

女性血清护骨素和转化生长因子 β 1与骨丢失率的关系

作者: 龙海燕, 张红, 伍贤平, 廖二元, 谢辉, 罗湘杭, 伍西羽, LONG Haiyan, ZHANG Hong, WU Xianping, LIAO Eryuan, XIE Hui, LUO Xianghang, WU Xiyu

作者单位: 龙海燕, LONG Haiyan (湖南省娄底市中心医院内分泌科, 湖南娄底, 417000), 张红, 伍贤平, 廖二元, 谢辉, 罗湘杭, 伍西羽, ZHANG Hong, WU Xianping, LIAO Eryuan, XIE Hui, LUO Xianghang, WU Xiyu (中南大学湘雅二医院代谢内分泌研究所, 长沙, 410011)

刊名: 中国骨质疏松杂志

英文刊名:
Chinese Journal of Osteoporosis

年, 卷(期): 2014(1)

本文链接: http://d.g.wanfangdata.com.cn/Periodical_zggzsszz201401002.aspx