维生素 D 缺乏相关性疾病研究进展

江巍 高凤荣

内蒙古医科大学 内蒙古自治区人民医院, 呼和浩特 010010

中图分类号: R589.5 文献标识码: A 文章编号: 1006-7108(2014) 03-0331-07

摘要: 维生素 D 是人体必需的一种脂溶性维生素, 它通过维生素 D 受体发挥其主要作用。近 10 年人们对于维生素 D 的关注度越来越高。根据流行病学调查, 目前全球近 10 亿人处于维生素 D 不足或缺乏状态, 我国人群维生素 D 不足现象也较为普遍。由于 1,25-羟维生素 D 半衰期非常短, 最近维生素 D 水平已用血清 25-羟维生素 D 水平来描述。多种证据表明, 维生素 D 缺乏不仅造成骨骼疾病(包括营养性佝偻病、软骨病、骨质疏松), 还与多种骨骼外疾病密切相关, 包括全因死亡率、心血管疾病及心血管病死亡率、代谢综合征(肥胖、糖耐量减低/糖尿病、脂代谢紊乱、高血压)、恶性肿瘤、感染、过敏性疾病及哮喘、精神及神经疾病、自身免疫性疾病、慢性肾病等。虽然使用维生素 D 治疗骨骼疾病已经得到广泛认可, 但是治疗骨骼外疾病的疗效及远期效果还不明确。维生素 D 缺乏已成为全世界的公共健康问题。本文综述了近年来对维生素 D 缺乏相关性疾病的研究进展。

关键词: 维生素 D 缺乏; 疾病; 研究进展

Research progress in vitamin D deficiency-related diseases

JIANG Wei, GAO Fengrong

Inner Mongolia Medical University, People's Hospital of Inner Mongolia Autonomous Region, Hohhot 010010, China

Corresponding author: GAO Fengrong, Email: gfr580223@126.com

Abstract: As an essential fat-soluble vitamin in human body, the main function of vitamin D is mediated by vitamin D receptor. In the past decade, vitamin D has drawn more and more attention. According to epidemiological survey, there are almost one billion people under the state of vitamin D insufficiency or deficiency all over the world. And this phenomenon is very common in China. Because of the short half-life of vitamin D, more recently, the level of serum 25-hydroxyvitamin D has been used to describe the level of vitamin D. Several lines of evidence indicate that the vitamin D deficiency is associated with not only skeletal disorders (including nutritional rickets, osteomalacia, and osteoporosis), but also non-skeletal disorders, such as mortality rate, cardiovascular disorders and mortality, metabolic syndrome (including obesity, IGT/diabetes mellitus, lipid metabolism disorders, and hypertension), cancer, infection, allergy and asthma, neurological and mental diseases, autoimmune diseases, and chronic kidney diseases. Although the vitamin D treatment of skeletal disorders has been widely recognized, the efficacy and long-term effect on non-skeletal disorders is not clear. Vitamin D deficiency has become a worldwide public health problem. This article reviews the research progress in vitamin D deficiency-related diseases in recent years.

Key words: Vitamin D deficiency; Disease; Research progress

维生素 D 是人体必需的一种脂溶性维生素, 属于类固醇衍生物, 包括 5 种化合物, 其中与健康关系较为密切的是维生素 D₂ (麦角钙化醇) 和维生素 D₃ (胆钙化醇)。当维生素 D 不足或缺乏时, 肠道吸收钙减少, 血钙降低, 刺激甲状旁腺释放甲状旁腺素 (PTH)。Chapuy 等学者提出了根据血清免疫反应性 PTH 水平的增高程度确定 25-(OH)D 不足或

缺乏。

国际骨质疏松基金会^[1]定义 25-(OH)D < 10 ng/ml 为维生素 D 严重缺乏, 25-(OH)D < 20 ng/ml 为维生素 D 缺乏, 20-30ng/ml 为维生素 D 不足。25-(OH)D 达到 30 ng/ml 为补充维生素 D 的最低目标, 最佳为 30 ~ 50 ng/ml。目前已被大多数学者接受并使用。

目前全球人群血清 25-(OH)D 的平均水平均较低, 维生素 D 不足的发生率为 30% ~ 50%, 全球近

*通讯作者: 高凤荣, Email: gfr580223@126.com

10亿人处于维生素D不足或缺乏状态。我国也有多项报道表明^[2-3],我国人群维生素D不足现象较为普遍。随着人们对维生素D缺乏的重视程度越来越高,学者们发现维生素D缺乏与许多疾病关联。下面重点讨论维生素D缺乏与各种疾病间的关系。

1 对骨骼肌肉系统的影响

维生素D缺乏症表现在骨骼肌肉系统疾病,包括营养性佝偻病、软骨病、骨质疏松等。

1.1 营养性佝偻病

人们对维生素D的认识初始于营养性佝偻病。营养性佝偻病是一种儿童性疾病。在过去的20年中,有超过60个国家报告了佝偻病的发生,且大部分发生于30个月以下的幼儿。Mahon等证明,胎儿骨佝偻病表现的严重程度与母体血清25-(OH)D水平的下降直接相关^[4]。大部分营养性佝偻病患者血清25-(OH)D低于5 ng/ml,但是如果患儿缺钙、近期得到阳光暴晒或维生素D治疗,血清25-(OH)D可能减低不明显或正常。一项调查表明,在美国营养性佝偻病患者中,只有22%的患儿血清25-(OH)D缺乏。

1.2 软骨病

软骨病是由于血清25-(OH)D缺乏、缺钙或缺磷,导致成年人的骨质矿化不足。多发生于妊娠、多产妇、体弱多病的老人。大部分情况下,软骨病患者的血清25-(OH)D水平降低。一项针对髌骨活检的横断面研究显示,过量骨质堆积(软骨病)只出现在血清25-(OH)D低于25 ng/ml的患者中^[5]。

1.3 骨质疏松

骨质疏松是一种慢性、进行性发展的以骨量和骨微结构下降为特征,易发生骨折的疾病。随着年龄增加,骨量丢失增加,跌倒和骨折的几率也随之增加。

血清25-(OH)D缺乏与骨密度减低有关,是脆性骨折的危险因子。NHANES III结果显示,髌骨骨密度减低与血清25-(OH)D水平直接相关,与钙摄入量无关^[6]。妇女健康行动(WHI)也显示,血清25-(OH)D水平每下降10 ng/ml,髌骨骨折危险即明显上升,如果血清25-(OH)D水平低于20 ng/ml,髌部骨折危险可增高近一倍。有研究表明^[7],只有血清25-(OH)D大于30 ng/ml时才能有效降低骨折风险。

一项对1237例受试者的荟萃分析表明,联合使

用钙剂和维生素D与单纯补充钙剂或安慰剂相比,跌倒风险降低22%^[8]。同时有荟萃分析表明^[9],只有当维生素D补充量大于700 IU/D或血清维生素D大于25 ng/ml,才能减低跌倒的危险。

2 对死亡率的影响

在NHANES III 65岁以上的老人中,血清25-(OH)D大于40 ng/ml的人群与血清25-(OH)D小于10 ng/ml的人群相比,死亡风险降低45%^[10]。但是这一结果并不能肯定维生素D水平与死亡率的关系,因为患有疾病或有潜在疾病的人群往往血清25-(OH)D较低。相比之下,在一项对18个绝经后妇女随机对照试验的荟萃分析表明,补充维生素D组(补充量300~2000 IU/D)与安慰剂组对比,死亡风险降低了7%。

3 对心血管病死亡率的影响

在上述研究中提示的死亡率的降低,其在很大程度上是由于心血管病死亡率降低导致的^[10]。Mertens等研究表明,低水平的维生素D与心血管疾病的风险增加有关^[11]。在另一项观察性队列研究中,对患者跟踪随访八年进行血管造影检查及血清25-(OH)D测定,结果表明,较高的维生素D水平(28 ng/ml)与较低的维生素D水平(8 ng/ml)相比,心血管病死亡率明显下降。最近,有研究表明,维生素D可能加速血管病变。一项针对患有2型糖尿病的非裔美国人的研究表明,维生素D水平与主动脉和颈动脉斑块钙化正相关,但在冠状动脉中却没有此现象^[12]。还有研究显示,维生素D缺乏是心血管疾病的独立危险因素^[13]。

4 与代谢综合征的关系

代谢综合征(MS)是指多种代谢异常簇集发生在同一个体的临床状态。主要包括肥胖、糖耐量减低/糖尿病、脂代谢紊乱、高血压等。目前有越来越多的证据表明,血清维生素D水平与MS的患病风险负相关。

4.1 维生素D与肥胖

国内外多项研究均显示,肥胖与血清维生素D水平呈负相关。McGill等对250例超重或肥胖的不同种族的成年人的研究发现,维生素D与体重、BMI、腰围呈负相关,血清25-(OH)D水平每降低0.74 nmol/L, BMI增加1 kg/m²,血清25-(OH)D水平每降低0.29 nmol/L,腰围增加1 cm。Cheng^[14]等

针对1882例非糖尿病患者体脂与血清25-(OH)D关系的研究发现,腹部皮下脂肪组织(SAT)含量和内脏脂肪组织(VAT)含量高者的人群的血清25-(OH)D缺乏的比例,较SAT和VAT含量低者高3倍,维生素D的水平与腹部皮下脂肪的变化,特别是内脏脂肪的变化有关。一项针对320名40~52岁妇女的研究显示,维生素D缺乏是肥胖的潜在危险因素^[15]。

4.2 维生素D与糖耐量异常/2型糖尿病

胰岛素抵抗是MS的中心环节和核心。胰腺β细胞表面存在VDR,维生素D会影响胰岛素的合成、分泌以及敏感性。在NHANES III的青少年中,血清25-(OH)D低于15 ng/ml的人群与血清25-(OH)D高于26 ng/ml的人群相比,血糖水平更高(OR,2.5;95%CI,1.0~6.4)^[16]。NHANES对126例健康人进行葡萄糖钳夹试验发现^[17],维生素D水平与胰岛素敏感性正相关,补充维生素D可降低2型糖尿病的发病风险。然而,泰国的一项对2641人的横断面调查显示^[18],老年人糖尿病的发病风险与低维生素D水平相关,青壮年糖尿病的发病风险与高维生素D水平相关,但这一结果尚需进一步证实。

4.3 维生素D与高血压

大多数研究认为维生素D水平与高血压负相关,且不受甲状旁腺素、血钙的影响^[19]。在NHANES III的一项针对成年人的观察性研究表明,血清25-(OH)D水平低于15 ng/ml的人群与血清25-(OH)D水平高于26 ng/ml的人群相比,高血压患病率高出2倍^[20]。国内外有许多研究证实,血清25-(OH)D能抑制肾素的表达,从而通过调节肾素血管紧张素系统影响血压。我国有小样本研究证实^[21],高血压患者的血清1,25-(OH)₂D水平明显低于健康人群,高血压可能通过影响肾功能间接导致1,25-(OH)₂D水平下降。

4.4 维生素D与血脂紊乱

目前虽有多项研究结果显示,血清维生素D水平与血脂水平有关,但与血脂各成分的相关程度尚无统一结论。有研究显示,血清维生素D水平与总胆固醇、低密度脂蛋白-胆固醇水平呈负相关,而与甘油三酯、高密度脂蛋白-胆固醇水平不相关。而另一项研究显示,血清维生素D水平与甘油三酯、高密度脂蛋白-胆固醇水平呈明显负相关。一项针对居住在英国的南亚人的研究发现,在校正了诸多影响因子后,血清维生素D水平与空腹apoA-I正相

关,而与总胆固醇、低密度脂蛋白-胆固醇水平不相关。

5 与恶性肿瘤的关系

维生素D可促进细胞分化、抑制细胞增殖。缺乏维生素D,可能导致某些恶性肿瘤的发生。

在一项关于结肠癌的病例对照研究的荟萃分析中表明^[22],血清25-(OH)D每升高20 ng/ml,结肠癌的发生率则减少至少40%(OR,0.57;95%CI,0.43~0.76)。还有研究表明^[23],饮食中钙的摄入也与结肠癌风险的降低有关。与之相反,WHI则表明,在8年随访期内,补充维生素D和钙对结肠癌的患病风险没有显著影响。但是,由于结肠癌的潜伏期较长,这一结果可能受到随访时间不足的影响。

乳腺癌的发生也有可能和维生素D不足有关。一项对7个观察性研究的荟萃分析表明^[24],与血清25-(OH)D不足的妇女相比,血清25-(OH)D充足的妇女乳腺癌患病风险明显降低(OR,0.55;95%CI,0.38~0.80)。我国也有研究表明^[25],血清25-(OH)D缺乏可能与乳腺癌发病有关。与结肠癌相似,饮食中钙的摄入也与乳腺癌风险的降低有关^[26]。然而,WHI依然发现,补充维生素D和钙对乳腺癌的患病风险没有显著影响。当校正了体重指数和体力活动后,血清25-(OH)D水平则与乳腺癌患病风险无相关性。近期,一项针对1800例早期乳腺癌患者的研究表明^[27],血清25-(OH)D与肿瘤大小相关,但与淋巴结转移、肿瘤分级无关,血清25-(OH)D高于30 ng/ml,则肿瘤更小,预后更好,治疗敏感性更高。而且,治疗后的乳腺癌幸存者中,维生素D缺乏现象也较为普遍^[28]。

一项包含了11项观察性研究的荟萃分析显示^[29],血清25-(OH)D的水平与前列腺癌无关。另一项跨国队列研究显示^[30],较高的血清25-(OH)D的水平并不能降低胃癌、食管癌、胰腺癌、子宫内膜癌、卵巢癌、肾癌和非霍奇金淋巴瘤的发病风险。但是,已有的研究显示维生素D对多种恶性肿瘤有抑制作用。

6 与感染的关系

维生素D可诱导固有免疫细胞表达抗菌肽。抗菌肽具有抗细菌和抗病毒活性,维生素D不足可导致机体防御反应降低,可能是感染易发的原因之一。

一项涉及7个观察性研究的荟萃分析表明,血

清维生素 D 低水平可明显增加活动性肺结核的风险 (OR, 0.68; 95% CI, 0.43 ~ 0.93)。还有研究显示^[31], 结核病患者中约有 97% 的患者血清 25-(OH)D 低于 30 ng/ml。然而, 应用维生素 D 治疗肺结核的效果, 目前还存在争议, 有待于进一步证实^[32]。

NHANES III 研究显示^[33], 无论在任何季节, 血清 25-(OH)D 低于 10 ng/ml 的人群与维生素 D 充足的人群相比, 呼吸道感染的发病率明显升高, 冬季血清 25-(OH)D 水平最低时发病率最高。有研究显示^[34], COPD 患者中维生素 D 缺乏患者比例增高, 且与病情严重程度呈正比。但也有临床报道显示^[35,36], 补充维生素 D 治疗后, 尽管血清 25-(OH)D 水平明显升高, 呼吸道感染的发病率及严重程度未见明显改善。

此外, 一项涉及法国 5 个观察性研究的荟萃分析显示^[37], 在 2994 例艾滋病患者中, 血清 25-(OH)D 低于 30 ng/ml 的占 86.7%, 其中接受抗逆转录病毒治疗的患者更低。一项针对 113 例艾滋病儿童的对照试验表明, 艾滋病感染组的血清 25-(OH)D 水平明显低于对照组^[38]。

7 与过敏性疾病及哮喘的关系

关于维生素 D 与过敏性疾病, 尤其是哮喘的关系, 目前尚有争议。调节性 T 细胞、B 细胞、树突状细胞、呼吸道上皮细胞等均参与人体免疫, 与过敏性疾病, 尤其是哮喘, 密切相关。而这些细胞内均有 1 α -羟化酶的表达, 也有维生素 D 受体的表达。

在哮喘疾病过程中, 气道平滑肌发挥了重要作用, 参与气道重塑和气道高反应性两个重要过程。而维生素 D 受体在气道平滑肌上高表达。有研究证实, 维生素 D 能减少气道平滑肌分裂增生, 并显著减少其分泌趋化因子的量, 从而减轻气道重塑和气道高反应性。

一项针对儿童的横断面调查显示^[39], 维生素 D 缺乏不仅与血清 IgE、嗜酸性粒细胞升高有关, 还可导致住院次数增加和抗生素使用率升高。还有研究发现, 当使用糖皮质激素治疗哮喘患儿时, 患儿体内维生素 D 水平越高, 所需糖皮质激素剂量越小^[40], 低维生素 D 水平与糖皮质激素用量增加及反应性降低有关^[41]。

另有研究报道, 婴儿期补充维生素 D 的孩子, 长大后更易患过敏性疾病。NHANES III 调查也发现, 血清 25(OH)D 高的成人患过敏性鼻炎的可能

性更大。

尽管不同的研究结果之间存在矛盾, 但仍然证明了血清维生素 D 水平对过敏性疾病, 尤其是哮喘, 有一定影响。

8 与神经、精神疾病的关系

随着世界人口老龄化的加剧, 老年痴呆也受到越来越多的关注。新近有研究表明^[42], 认知功能障碍, 尤其是阿尔兹海默病和血管性痴呆, 可能与维生素 D 受体和血清维生素 D 水平有密切关系。动物实验表明, 维生素 D 可减少神经元凋亡数目, 调节神经营养因子水平, 维持神经元密度, 从而发挥神经保护作用。此外, 维生素 D 还具有血管保护作用^[43]。美国威斯康星大学附属医院 60 岁以上老人的一项调查显示, 血浆中 25(OH)D₃ 的含量与简易精神状态量表评分正相关。

流行病学调查显示, 随着纬度增加, 多发性硬化的发病率也随之上升。一项病例对照研究显示, 维生素 D 充足的人群中, 多发性硬化的发病率较低。但这一结果只局限于白人, 在非洲裔美国人中并无此现象。此外^[44], 目前尚无研究表明维生素 D 在多发性硬化的治疗中有积极作用。

血清维生素 D 水平对精神疾病也有一定影响。芬兰一项研究显示, 在 1 周岁以内补充维生素 D 的儿童患精神分裂的风险明显降低。但是这一结果与坚持补充维生素 D 无明显关联, 而且仅在男性中表现出相关性。有研究显示, 维生素 D 低水平与多发性硬化患者的抑郁状态有关^[45]。一项随机对照试验显示, 针对抑郁症患者补充 20000 ~ 40000 IU/w 维生素 D 或安慰剂共 1 年, 补充维生素 D 组较安慰剂组症状明显改善。但是目前尚无维生素 D 与其他精神疾病有关的报道。

9 与自身免疫疾病的关系

维生素 D 受体几乎表达于所有免疫细胞, 如活化的 CD4⁺、CD8⁺ T 细胞、B 细胞、中性粒细胞及抗原呈递细胞, 维生素 D 调节作用的失稳与自身免疫疾病的发病有密切关系。

系统性红斑狼疮 (SLE) 是一种累及全身多系统的自身免疫性疾病。我国有研究显示^[46], SLE 患者血清维生素 D 水平明显低于正常对照组。Ben-Zvi 等研究显示^[47], SLE 活动程度与血清维生素 D 缺乏呈正相关。动物实验也证明^[48], 对于 SLE, 活性维生素 D 与大剂量激素的治疗效果相似, 可减轻狼

疮鼠尿蛋白、关节肿胀及肾损害。

类风湿性关节炎(RA)的免疫紊乱多由Th1细胞激活开始,产生一系列炎症效应。维生素D缺乏可加重Th1引起的免疫反应。动物实验证明^[49],VDR缺陷的小鼠中,软骨及滑膜损害更严重。研究发现^[50],维生素D缺乏在非高加索人种及抗环瓜氨酸抗体阳性的患者中更常见,而且疾病的活动度及损害评分与血清维生素D水平呈负相关。我国也有研究得出相似结论^[51]。然而,也有研究认为^[52]血清维生素D水平与RA活动程度、相关抗体无关。但大多数学者均认为,提高血清维生素D水平可降低RA罹患风险。

此外,还有报道表明^[48,53-57],维生素D缺乏与炎症性肠病、系统性硬化病、未分化结缔组织病、白塞病、干燥综合征、家族型银屑病、强制性脊柱炎等自身免疫性疾病的发生、发展有关。

10 与慢性肾脏病的关系

慢性肾脏病(CKD)目前已成为全球公共卫生问题,2011年,我国的透析患者已达到26万人。近年来,血清维生素D水平与CKD的关系也受到重视。一项前瞻性的队列横断面研究显示^[58],对1026例未透析的CKD患者进行调查,血清维生素D水平的缺乏与GFR呈负相关。吕轶伦等对358例住院的CKD患者进行回顾性分析发现^[59],维生素D缺乏的患病率为39.66%,维生素D不足的患病率为44.97%,并且患病率随CKD分级逐渐增加。Beena Bansal等对65例血液透析患者调查发现^[60],2/3的患者有严重的维生素D缺乏。NHANES III数据显示^[61],在非洲裔美国人中,血清维生素D缺乏者,罹患肾功能不全的风险更大。而且,活性维生素D也可提高CKD患者的生存率,其机制可能通过抑制肾素表达,降低RAS系统活性而减轻足细胞损伤,调节肾脏血流动力学,减轻肾脏损伤^[62]。

11 总结与展望

维生素D缺乏已成为全世界的公共健康问题。目前针对维生素D缺乏,尚缺乏多中心的大规模研究,维生素D缺乏造成某些疾病的的机制尚不明确,使用维生素D治疗骨骼外疾病的疗效及远期效果还有待于进一步证实。

【参 考 文 献】

[1] Rosen CJ. Vitamin D Insufficiency. N Engl J Med, 2011, 364

(1):248;254.

- [2] Zhu Hanmin, Cheng Qun, Gan Jiemin, et al. Vitamin D status in healthy man and woman in Shanghai. Chinese Journal of Osteoporosis and Bone Mineral Research, 2010, 3:157-163.
- [3] Zhang Qiao, Peng Nianchun, Xu Shujing, et ai. Vitamin D status in healthy adults in Guiyang of China. Chinese Journal of Endocrinology and Metabolism, 2011, 27:659-663.
- [4] Mahon P, Harvey N, Crozier S, et al. Low maternal vitamin D status and fetal bone development; a cohort study. Bone Miner Res doi:2009,10. 1359/jbmr. 090701.
- [5] Priemel M, von Dörmann C, Klatte TO, et al. Bone mineralization defects and vitamin D deficiency: histomorphometric analysis of iliac crest bone biopsies and circulating 25-hydroxyvitamin D in 675 patients. J Bone Miner Res, 2010, 25:305-312.
- [6] Bischoff-Ferrari HA, Kiel DP, Dawson-Hughes B, et al. Dietary calcium and serum 25-hydroxyvitamin D status in relation to BMD among U. S. Adults. J Bone Miner Res, 2009, 24:935-942.
- [7] Adam JS, Hewison M. Update in vitamin D. J Clin Endocrinol Metab, 2010, 95:471-478.
- [8] Wang Tan, Chen Decai. Vitamin D and Osteoporosis. Chinese Journal of Practical Internal Medicine. 2011, 31:514-516.
- [9] Bischoff-Ferrari HA, Dawson-Hughes B, Staehelin HB, et al. Fall prevention with supplemental and active forms of vitamin D; a meta-analysis of randomized controlled trials. BMJ, 2009, 339: b3692.
- [10] Ginde AA, Scragg R, Schwarg CA Jr. Prospective study of serum 25-hydroxyvitamin D level, cardiovascular disease mortality, and all-cause mortality in older U. S. adults. J Am Geriatr Soc, 2009, 57:1595-1603.
- [11] Mertens PR, Muller R. Vitamin D and cardiovascular risk. Int Urol Nephrol, 2010, 42:165-171.
- [12] Freedman BI, Wagenknecht LE, Hairston KG, et al. Vitamin D, adiposity, and calcified atherosclerotic plaque in African-Americans. J Clin Endocrinol Metab, 2010, 95(3):1076-1083.
- [13] Kienreich K, Tomaschitz A, Verheyen N, et al. Vitamin D and cardiovascular disease. Nutrients. 2013 Jul 31; 5(8):3005-3021.
- [14] CHENG S, MASSARO JM, FOX CS, et al. Adiposity, cardiometabolic risk, and vitamin D status: the Framingham Heart Study. Diabetes, 2010, 59(1):242-248.
- [15] Grineva EN, Karonova T, Mischeeva E, et al. Vitamin D deficiency is a risk factor for obesity and diabetes type 2 in women at late reproductive age. Aging (Albany NY). 2013, Jul, 5(7):575-581.
- [16] Reis JP, von Muhlen D, Miller ER III, Michos ED, Appel LJ. Vitamin D status and cardiometabolic risk factors in the United States adolescent population. Pediatrics, 2009, 124(3):e371-e379.
- [17] Zhao G, Ford ES, Li C. Associations of serum concentrations of 25-hydroxyvitamin D and parathyroid hormone with surrogate markers of insulin resistance among U. S. adults without

- physician-diagnosed diabetes; NHANES, 2003-2006. *Diabetes Care*, 2010, 33(2):344-347.
- [18] Chailurkit LO, Aekplakorn W, Ongphiphadhanakul B. The association between vitamin D status and type 2 diabetes in a Thai population, a cross-sectional study. *Clin Endocrinol*, 2012, doi: 10.1111/j.1365-2265.
- [19] Kim MK, Il Kang M, Won Oh K, et al. The association of serum vitamin D level with presence of metabolic syndrome and hypertension in middle-aged Korean subjects. *Diabetes Care*, 2010, 33(2):344-347.
- [20] Reis JP, von Muhlen D, Miller ER III, et al. Vitamin D status and cardiometabolic risk factors in the United States adolescent population. *Pediatrics*, 2009, 124(3):e371-e379.
- [21] Liu Chong, Wei Tiemin, Zeng Chunlai. A Study on Serum 1,25(OH)₂-vitamin D Level in Patients with Primary Hypertension. *Prevention and Treatment of Cardio-Cerebral-Vascular Disease*, 2011, 11(3):182-186.
- [22] Yin L, Grandi N, Raum E, Haug U, Arndt V, Brenner H. Meta-analysis: longitudinal studies of serum vitamin D and colorectal cancer risk. *Aliment Pharmacol Ther*, 2009, 30(2):113-125.
- [23] Jenab M, Bueno-de-Mesquita HB, Ferrari P, et al. Association between pre-diagnostic circulating vitamin D concentration and risk of colorectal cancer in European populations: a nested case-control study. *BMJ*. 2010;340:b5500.
- [24] Chen P, Hu P, Xie D, Qin Y, Wang F, Wang H. Meta-analysis of vitamin D, calcium and the prevention of breast cancer. *Breast Cancer Res Treat*, 2010, 121(2):469-477.
- [25] Zhuang ZG, Yu JM, Jiang PQ. 25-hydroxyvitamin D and its clinical significance in Breast cancer patients. *The Journal of Practical Medicine*, 2010, 26(2):244-246.
- [26] Rssi M, McLaughlin JK, Lagiou P, et al. Vitamin D intake and breast cancer risk: a case-control study in Italy. *Ann Oncol*, 2009, 20(2):374-378.
- [27] Hatse S, Lambrechts D, Verstuyf A, et al. Vitamin D status at breast cancer diagnosis: correlation with tumor characteristics, disease outcome and genetic determinants of vitamin D insufficiency. *Carcinogenesis*, 2012, 69(3):243-248.
- [28] Trukova KP, Grutsch J, Lammersfeld C, et al. Prevalence of vitamin D insufficiency among breast cancer survivors. *Nutr Clin Pract*, 2012, 27(1):122-128.
- [29] Gandini S, Boniol M, Haukka J, et al. Meta-analysis of observational studies of serum 25-hydroxyvitamin D levels and colorectal, breast and prostate cancer and colorectal adenoma [published online ahead of print July 21, 2010]. *Int J Cancer*. doi: 10.1002/ijc.25439.
- [30] Helzlsouer KJ; VDPDP Steering Committee. Overview of the cohort consortium vitamin D pooling project of rarer cancers. *Am J Epidemiol*, 2010, 172(1):4-9.
- [31] Desai NS, Tukvadze N, Frediani JK, et al. Effects of sunlight and diet on vitamin D status of pulmonary tuberculosis patients in Tbilisi, Georgia. *Nutrition*, 2012, 28(4):362-366.
- [32] Wejse C, Gomes VF, Rabna P, et al. Vitamin D as supplementary treatment for tuberculosis: a double-blind, randomized, placebo-controlled trial. *Am J Respir Crit Care Med*, 2009, 179(9):843-850.
- [33] Ginde AA, Mansbach JM, Camargo CA Jr. Association between serum 25-hydroxyvitamin D level and upper respiratory tract infection in the Third National Health and Nutrition Examination Survey. *Arch Intern Med*, 2009, 169(4):384-390.
- [34] Janssens W, Bouillon R, Claes B, et al. Vitamin D deficiency is highly prevalent in COPD and correlates with variants in the vitamin D-binding gene. *Thorax*, 2010, 65:215-220.
- [35] Li-Ng M, Aloia JF, Pollack S, et al. A randomized controlled trial of vitamin D3 supplementation for the prevention of symptomatic upper respiratory tract infections. *Epidemiol Infect*, 2009, 137:1396-1404.
- [36] Rimmelts HH, Spoorenberg SM, Oosterheert JJ, et al. The role of vitamin D supplementation in the risk of developing pneumonia: three independent case-control studies. *Thorax*. 2013 Jul 26. doi: 10.1136/thoraxjnl-2013-203623.
- [37] Allavena C, Delpierre C, Cuzin L, et al. High frequency of vitamin D deficiency in HIV-infected patients: effects of HIV-related factors and antiretroviral drugs. *J Antimicrob Chemother*, 2012, doi:10.1093/jac/dks176.
- [38] Meyzer C, Frange P, Chappuy H, et al. Vitamin D Deficiency and Insufficiency in HIV Infected Children and Young Adults. *Pediatr Infect Dis J*. 2013 Jul 31.
- [39] Brehm JM, Celedon JC, Soto-Quiros ME, et al. Serum vitamin D levels and markers of severity of childhood asthma in Costa Rica. *Am J Respir Crit Care Med*, 2009, 179(9):765-771.
- [40] Searing DA, Zhang Y, Murphy JR, et al. Decreased serum Vitamin D levels in children with asthma are associated with increased corticosteroid use. *J Allergy Clin Immunol*, 2010, 125:995-1000.
- [41] Frieri M. The role of Vitamin D in asthmatic children. *Curr Allergy Asthma Rep*, 2011, 11:1-3.
- [42] Constans T, Mondon K, Annweiler C, et al. Vitamin D and cognition in the elderly. *Psychol Neuropsychiatr Vieil*, 2010, 8:255-262.
- [43] Grant WB. Vitamin D might reduce some vascular risk factors and, consequently, risk of dementia. *Neth J Med*, 2011, 69:51.
- [44] Ascherio A, Munger KL, Simon KC. Vitamin D and multiple sclerosis. *Lancet Neurol*, 2010, 9(6):599-612.
- [45] Ashtari F, Ajalli M, Shaygannejad V, et al. The relation between Vitamin D status with fatigue and depressive symptoms of multiple sclerosis. *J Res Med Sci*. 2013 Mar;18(3):193-197.
- [46] Shi H, Ren TL, Huang HY, et al. Changes and significance of vitamin D levels in SLE patient. *Shandong Medical Journal*, 2011, 51(2):104-105.
- [47] Ben-Zv I, Aranow C, Mackay M, et al. The impact of vitamin D on dendritic cell function in patients with systemic lupus erythematosus. *PLoS One*, 2010, 5(2):e9193.
- [48] Zold E, Barta Z, Bodolay E. Vitamin D deficiency and

- connectivetissue disease. *Vitam Horm*, 2011, 86:261-286.
- [49] Zwerina K, Baum W, Axmann R, et al. Vitamin D receptor regulates TNF-mediated arthritis. *Ann Rheum Dis*, 2011, 70: 1122-1129.
- [50] Kerr GS, Saballi I, Richards JS, et al. Prevalence of vitamin D insufficiency/deficiency in rheumatoid arthritis and associations with disease severity and activity. *Rheumatology*, 2011, 38: 53-59.
- [51] Wang Maofeng, Chen Debao, Lou Yonggang, et al. Association study between 25(OH) vitamin D and early rheumatoid arthritis. *Laboratory Medicine and Clinic*. 2010, 7(11):1076-1077.
- [52] Marques CD, Dantas AT, Fragoso TS, et al. The importance of vitamin D levels in autoimmune diseases. *Rev Bras Reumatol*. 2010, 50:67-80.
- [53] Kelly P, Suibhne TN, O' Morain C, et al. Vitamin D status and cytokine levels in patients with Crohn's disease. *Int J Vitam Nutr Res*. 2011, 81(4):205-210.
- [54] Caramasehi P, Dalla GA, Ruzzenente O, et al. Very low levels of vitamin D in systemic sclerosis patients. *Clin Rheumatol*, 2010, 29:1419-1425.
- [55] Cutolo M, Plebani M, Shoenfeld Y, et al. Vitamin D endocrine system and the immune response in rheumatic diseases. *Vitam Horm*. 2011, 86:327-351.
- [56] Hamzaoui K, Ben Dhifallah I, Karray E, et al. Vitamin D modulates peripheral immunity in patients with Behçet's disease. *Clin Exp Rheumatol*, 2010, 28: S50-57.
- [57] Zhou Li, Xin Xiafei. Research of active vitamin D and ankylosing spondylitis. *Modern Practical Medicine*. 2011, 23(9):970-979.
- [58] McCullough K, Sharma P, Ali T, et al. Measuring the population burden of chronic kidney disease: a systematic literature review of the estimated prevalence of impaired kidney function. *Nephrol Dial Transplant* 2011, Sep 29. [Epub ahead of print].
- [59] Lv Yilun, Lin Ying, Shi Hao, et al. Vitamin D insufficiency and deficiency in chronic kidney disease patients. *Chinese Journal of Nephrology*. 2009, 25(9):668-672.
- [60] Beena Bansal, Shyam Bansal, Ambrish Mithal, et al. Vitamin D deficiency in hemodialysis patients. *Indian J Endocrinol Metab*. 2012 16(2): 270-273.
- [61] Melamed ML, Astor B, Michos ED, Hostetter TH, Powe NR, Muntner P. 25-hydroxyvitamin D levels, race, and the progression of kidney disease. *J Am Soc Nephrol*. 2009; 20(12):2631-2639.
- [62] Rodriguez-Turbe B, Garcia Garcia G. The role of tubulointerstitial inflammation on the progression of chronic renal failure. *Nephron Clin Pract*, 2010, 116: c81-8.

(收稿日期: 2013-06-17)

(上接第 330 页)

- [12] Guler-Yuksel M, Klarenbeek NB, Goekoop-Ruiterman YP, et al. Accelerated hand bone mineral density loss is associated with progressive joint damage in hands and feet in recent-onset rheumatoid arthritis. *Arthritis Res Ther*, 2010, 12(3):R96.
- [13] Yatsugi N, Tsukazaki T, Osaki M, et al. Apoptosis of articular chondrocytes in rheumatoid arthritis and osteoarthritis: correlation of apoptosis with degree of cartilage destruction and expression of apoptosis-related proteins of p53 and c-myc. *J Orthop Sci*, 2000, 5(2):150-6.
- [14] Wang X, Kua HY, Hu Y, et al. p53 functions as a negative regulator of osteoblastogenesis, osteoblast-dependent osteoclastogenesis, and bone remodeling. *J Cell Biol*, 2006, 172(1):115-25.
- [15] Leong WF, Zhou T, Lim GL, et al. Protein palmitoylation regulates osteoblast differentiation through BMP-induced osterix expression. *PLoS One*, 2009, 4(1):e4135.
- [16] Fujita K, Janz S. Attenuation of WNT signaling by DKK-1 and -2 regulates BMP2-induced osteoblast differentiation and expression of OPG, RANKL and M-CSF. *Mol Cancer*, 2007, 6:71.
- [17] Soderstrom K, Stein E, Colmenero P, et al. Natural killer cells trigger osteoclastogenesis and bone destruction in arthritis. *Proc Natl Acad Sci U S A*, 2010, 107(29):13028-33.
- [18] Textor S, Fiegler N, Arnold A, et al. Human NK cells are alerted to induction of p53 in cancer cells by upregulation of the NKG2D ligands ULBP1 and ULBP2. *Cancer Res*, 2011, 71(18):5998-6009.
- [19] Haupt Y, Maya R, Kazaz A, et al. Mdm2 promotes the rapid degradation of p53. *Nature*, 1997, 387(6630):296-9.

(收稿日期: 2013-03-29)

维生素D缺乏相关性疾病研究进展

作者: [江巍](#), [高凤荣](#), [JIANG Wei](#), [GAO Fengrong](#)
作者单位: [内蒙古医科大学](#) [内蒙古自治区人民医院](#), 呼和浩特, 010010
刊名: [中国骨质疏松杂志](#)

ISTIC

英文刊名: [Chinese Journal of Osteoporosis](#)

年, 卷(期): 2014(3)

本文链接: http://d.g.wanfangdata.com.cn/Periodical_zggzsszz201403025.aspx